


Fiche récapitulative sur l'injection d'adrénaline ANAPEN

Comment utiliser Anapen® ?



Après l'injection d'Anapen®



E- Vérifier que l'auto-injecteur est passé au rouge : l'injection est terminée. Si l'indicateur n'est pas rouge, recommencer avec un autre injecteur.

F- Après l'injection, l'aiguille dépasse du dispositif. Pour la recouvrir, replacer la partie large du bouchon noir protecteur de l'aiguille en l'enclenchant sur l'extrémité ouverte (contenant l'aiguille).

G- Une seconde injection peut être nécessaire si les symptômes ne s'améliorent pas ou s'aggravent dans les 10 à 15 minutes qui suivent la première injection.

Immédiatement après avoir utilisé Anapen appelez le 15 ou le 112 et dites que vous faites un choc anaphylactique et que vous avez reçu une injection intramusculaire d'adrénaline.

Le professionnel de santé qui vous prendra en charge récupérera le stylo injectable utilisé.

Bon usage du médicament

Lisez attentivement la notice avant d'utiliser Anapen.

Anapen est utilisé dans le traitement d'urgence des symptômes du choc anaphylactique.

Vous devez toujours avoir 2 stylos injecteurs avec vous en cas d'échec de la 1^{ère} injection ou si la dose n'est pas suffisante.

Notification des événements indésirables

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

P.0614